

INSECTICIDA ACARICIDA

Mamboretá

CONCENTRADO EMULSIONABLE

ABA

LINEA JARDIN

Composición:
 abamectin: mezcla de > 80% avermectina B1a:(5-0-desmetil avermectina A1a) y < 20% avermectina B1b:(5-0-desmetil-25-de(1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a).....1,8 g
 solvente y coadyuvantes c.s.p..... 100 cm³

**PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE
 LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA ADJUNTA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito en SENASA - con el N° 00345
 Industria Argentina
 Fecha de Vencimiento:
 Ver en el envase
 Cont. Neto: Ver en el envase
 Partida N°: Ver en el envase
 Inflamable de 1ra. Categoría

ARIPA S.R.L.
 Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PRECAUCIONES:
 NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación de los alimentos. Usar anteojos de protección, guantes, pantalones largos, remera con mangas largas durante la aplicación. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa de trabajo. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de la aplicación todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
 MODERADAMENTE TOXICO para ABEJAS. No aplicar en el horario de pecoreo de las abejas. En caso de aplicar, tapar las colmenas (entrada a las piqueras) con arpillera húmeda o goma espuma. Hacer aplicaciones nocturnas o a la mañana temprano.
 PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para AVES. De cualquier manera, no aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción.
 MODERADAMENTE TOXICO para PECES. No aplicar sobre fuentes de agua. Tapar estanques, fuentes, peceras u otros reservorios destinados a la estancia de organismos acuáticos.

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: ESTE ENVASE VACIO NUNCA DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACION.

DERRAMES: En caso de derrame del producto, cubrir con material absorbente (aserrín, tierra, arena, etc.). Barrer y enterrar en lugar seguro cuidando de no contaminar fuentes y cursos de agua. Luego, si el piso es firme, lave con abundante agua el lugar. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar fresco, ventilado y seguro, a cubierto de los rayos solares, lejos del fuego, alimentos y fuera de la casa.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, inducir al VÓMITO. No administrar nada vía oral a personas inconscientes. Por salpicaduras en ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Por salpicaduras en la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En todos los casos CONSULTE CON UN MÉDICO.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
 PRODUCTO QUE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV).

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004 - **Pcia. de Bs. As.:** Centro Nac. de Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - **Rosario:** Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - **Mendoza:** Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600 / 2653 / 0714 / 4800 - **Neuquén:** Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - **Chaco:** Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES:
 El insecticida acaricida **Mamboretá ABA** es de origen natural y actúa por contacto directo e ingestión y es de movimiento translaminar. Actúa en forma curativa y preventiva. Controla ácaros e insectos (estados adultos e inmaduros). Es de acción lenta y, si bien los insectos después de su aplicación no se alimentan, demora de 3 a 7 días, dependiendo de la temperatura, para alcanzar la mortalidad máxima. No requiere el agregado de adherentes o surfactantes pero conviene el agregado de aceite mineral **Mamboretá OIL 85E** para algunas plagas, según lo indicado en el cuadro de recomendaciones de uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación de la emulsión: mezclar la dosis a utilizar de **Mamboretá ABA** con un poco de agua y agitar hasta formar la emulsión. Luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total agitando siempre fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar el producto preparado de un día para el otro.
Equipos de aplicación: en explotaciones reducidas, puede aplicarse con cualquier máquina pulverizadora, sea manual o a motor. Durante la aplicación deberá mantenerse la emulsión en agitación. Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis* (para 1 litro de agua)	Momento de aplicación
HORTICOLAS	Arañuela roja común (Tetranychus urticae)	0,8 cm ³ (16 gotas)	Pulverizar al primer indicio de infestación. Evitar el escurrimiento.
			Aplicar al determinar las picaduras en las hojas o las primeras galerías; Repetir a los 7 días. Pulverizar con alto volumen de agua y alta presión. Mínimo: 6 cm ³ /100 m ² de terreno. Máximo: 12 cm ³ / 100 m ² de terreno. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Gusanos minadores (Liriomyza spp.)		Aplicar al observar los primeros indicios de presencia de arañuelas. Pulverizar todo el follaje; evitar el escurrimiento. Repetir de ser necesario. No realizar más de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
			Aplicar al observar los primeros indicios de infestación. Asperjar dando una cobertura total, pero evitar el escurrimiento. Repetir la aplicación cuando sea necesario.
Tomate	Acaro del bronceado (Aculops lycopersici)	0,6-0,7 cm ³ (12-14 gotas)	
	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,5-0,7 cm ³ (10-14 gotas)	

Cultivo	Plaga	Dosis* (para 1 litro de agua)	Momento de aplicación	
Tomate	Polilla del tomate (Tuta absoluta)	0,8-1 cm ³ (16-20 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	De acuerdo al volumen de agua utilizado aplicar un mínimo de 5,6 cm ³ / 100 m ² de terreno y un máximo de 15 cm ³ / 100 m ² de terreno. Usar la dosis más alta para altas infestaciones, o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga y/o cuando el cultivo muestre mayor densidad foliar.	
FRUTALES	Acaro blanco (Polyphagotarsonemus latus)	0,15-0,2 cm ³ (3-4 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Cuando se observen los primeros ácaros.	
	Acaro de la yema (Aceria sheldoni)	0,2 cm ³ (4 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Pulverizar al hincharse las yemas. No aplicar durante la floración	
	Citrus	Acaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora)	0,15-0,2 cm ³ (3-4 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Aplicar después de la floración cuando observe los primeros ácaros sobre frutos pequeños formados (menor de 2 cm de diámetro). Repetir cuando ocurran nuevas infestaciones.
				Aplicar al observar las larvas de primer estadio sobre brotes tiernos morados recién formados (3-5 cm. de longitud). Volumen de aplicación mínimo: 5 litros de agua / 100 m ² de terreno.
	Minador de las hojas (Phyllocnistis citrella)	0,1 cm ³ (2 gotas) + 5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E		
Frutilla	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,8-1 cm ³ (16-20 gotas)	Aplicar a los primeros indicios de infestación. Asegurarse de mojar toda la planta, pero evitar el escurrimiento. Repetir la acción a los 7-10 días. Mínimo: 6 cm ³ / 100 m ² de terreno. Máximo: 12 cm ³ / 100 m ² de terreno. No tratar más de 4 veces por ciclo de cultivo.	
Peral	Arañuela parda (Bryobia rubrioculus)	0,4-0,5 cm ³ (8-10 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Para el control de ácaros: Iniciar las aplicaciones al determinar 1 ó 2 arañuelas por hoja. Repetir las aplicaciones de ser necesario.	
	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)			
	Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)			
	Psílido del peral (Psylla pyricola)	0,75 cm ³ (15 gotas) + 2,5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Iniciar las aplicaciones al determinar, en promedio, 1 ó 2 ninfas por brote terminal o cuando aparezca la melaza típica, después de la floración. No aplicar más de 30 cm ³ / 100 m ² de terreno y por época de cultivo.	
Manzana	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,4 cm ³ (8 gotas) + 5 cm ³ de Mamboretá OIL 85E	Para lograr mejores resultados, realizar la aplicación desde caída de pétalos hasta 4 semanas después.	
	Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)			
ORNAMENTALES Y FLORALES	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,25-0,5 cm ³ (5-10 gotas)	Con los primeros indicios de infestación Mínimo: 5,6 cm ³ / 100 m ² de terreno. Máximo: 15 cm ³ / 100 m ² de terreno.	
Clavel	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,25-0,5 cm ³ (5-10 gotas)	Con los primeros indicios de infestación.	
			Para gusanos minadores pulverizar para proteger los brotes nuevos. De ser necesario repetir cada 7 días. Mínimo: 5,6 cm ³ / 100 m ² de terreno. Máximo: 15 cm ³ / 100 m ² de terreno.	
Crisantemo	Gusanos minadores (Liriomyza spp.)	0,25-0,5 cm ³ (5-10 gotas)		
Ornamentales	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,25-0,5 cm ³ (5-10 gotas)	Con los primeros indicios de infestación. Mínimo: 5,6 cm ³ / 100 m ² de terreno. Máximo: 15 cm ³ / 100 m ² de terreno.	
Rosales	Arañuela roja común (Tetranychus telarius)	0,25-0,5 cm ³ (5-10 gotas)	Con los primeros indicios de infestación. Mínimo: 5,6 cm ³ / 100 m ² de terreno. Máximo: 15 cm ³ / 100 m ² de terreno.	

* Para dosificar volúmenes mayores a 1 litro de agua, deberá tomar en cuenta estas relaciones de equivalencias:
 1 cucharadita de café = 2,50 cm³ 1 cucharada de postre = 6,50 cm³
 1 cucharadita de té = 3,50 cm³ 1 cucharada sopera = 10 cm³

RESTRICCIONES DE USO:
 Intervalo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha de partes comestibles: 3 días para APIO, MELÓN, SANDIA, TOMATE, PIMIENTO, PEPINO y FRUTILLA; 7 días para CÍTRICOS; 14 días para MANZANAS y PERAS. Ornamentales y florales: sin restricciones.

COMPATIBILIDAD: **Mamboretá ABA** puede mezclarse con la mayoría de los productos insecticidas, acaricidas, herbicidas y funguicidas. Pero para mayor seguridad hacer pequeñas pruebas antes de usar.

FITOTOXICIDAD:
 Alas dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: consulte su aplicación con un Ingeniero Agrónomo

Importante:
 Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, **ARIPA S.R.L.** no se responsabiliza por los daños, accidentes o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto al prescrito en esta etiqueta.

En Huertas y Jardines

Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

-  Tel./Fax: (011) 4621-7723 / 7655
-  E-mail: info@mamboreta.com.ar
-  www.mamboreta.com.ar
-  Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó Pcia. de Bs. As. - Argentina - Argentina



CUIDADO



CUIDADO