

INSECTICIDA



ACARICIDA

bio Mamboretá

CONCENTRADO EMULSIONABLE

OIL 85 E



Composición:

| | |
|--|---------------------|
| aceite mineral refinado parafínico | 85 g. |
| emulsionante c.s.p. | 100 cm ³ |

Viscosidad 95 - 100 SSU a 37,8 °C
 Residuo no Sulfonable no menor a 92 %
 Punto de Destilación (Rango 10% - 90%) 44 °C

Residuo No Sulfonable (RnS) = mínimo 99%

**LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO
 ADJUNTO ÁNTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
 NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA**

Inscrito en **SENASA** con el N° LJ-523
 Industria Argentina
 Fecha de Vencimiento:
 Ver en el envase

Partida N°: Ver en el envase
 Cont. Neto: Ver en el envase
 Inflamable de 3da categoría

ARIPA S.R.L.

Cerrito 1133 (B1714ARC) - Ituzaingó - Provincia de Buenos Aires - Argentina
 (011) 4621-7723 +54 11 2389-3821 www.mamboretta.com.ar

Advertencia: Garantizamos que la calidad de este producto está conforme con nuestras especificaciones. Dado que la aplicación del mismo está fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos por los daños y perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado en este rótulo.

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y ojos. No ingerir. Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, protector facial y ropa adecuada. Lavarse con abundante agua y jabón, todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No comer, beber ni fumar durante las operaciones.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves.

Ligeramente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua.

Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: Efectuar un prolijo lavado del remanente de los envases mediante triple lavado y del equipo de aplicación, con agua. Vierta el líquido de enjuague en el tanque de la pulverizadora y aplique sobre el cultivo.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, cerrado y en lugares seguros, secos, frescos y bien ventilados.

DERRAMES: Circunscribir el líquido derramado con algún material absorbente no inflamable (tierra, arena, etc.). Barrer y recoger el barrido. Lavar el área contaminada con agua y detergente no iónico. Disponer de manera tal que no contamine el medio ambiente.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, brindar asistencia médica de inmediato, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Por salpicaduras en piel u ojos, enjuagar con abundante agua limpia. En todos los casos procurar asistencia médica.

Advertencia para el médico: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV)

Toxicidad inhalatoria: Clase III – CUIDADO.

Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV.

Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV

Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: La inhalación o excesiva exposición, pueden causar irritación en nariz, garganta, pulmones y tracto respiratorio. Puede causar suave irritación en piel con contacto prolongado o repetido. Puede causar vómitos o diarrea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

-Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247

-Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480

-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777

-Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961

-TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727 Cuerpo derecho



CUIDADO



GENERALIDADES

BIO MAMBORETA OIL 85 E es un aceite mineral parafínico de alta refinación, indicado para el control de plagas en cítricos, frutales de hoja caduca, olivo, palta y árboles ornamentales.

Actúa por contacto, produciendo la muerte de las plagas por asfixia.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación: Llenar el depósito de la pulverizadora con agua limpia. Luego se agrega la cantidad necesaria de aceite, esperando alrededor de un minuto para que el retroceso del líquido, después de su paso por la bomba, aumente la estabilidad de la emulsión. Luego completar el volumen de agua requerido.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: **BIO MAMBORETA OIL 85 E** puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales. La mezcla debe usarse en el día de su preparación.

RECOMENDACIONES DE USO

Plagas que controla: cochinilla negra circular (*Chrysomphalus ficus*); cochinilla blanca del tronco (*Unaspis citri*); cochinilla coma o serpetta (*Mytilococcus beckii*); cochinilla del Delta (*Lecanium deltae*); cochinilla algodonosa (*Pericerya purchasi*); cochinilla blanca del olivo (*Aspidiotus heredae*); cochinilla roja común (*Chrysomphalus dictyospermi*); cochinilla gris circular (*Chrysomphalus ficus*); cochinilla negra del olivo (*Saissetia oleae*); cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii*); cochinilla blanca de los citrus (*Lecanium hesperidium*); cochinilla parlatoria (*Lepidosaphes ulmi*); ácaro del tostado (*Phyllocoptura oleivora*); ácaro transmisor de la lepra explosiva (*Brevipalpus inornatus*); mosca blanca (*Aleurothrixus floccosus*); pulgones de los citrus (*Toxoptera aurantii*, *Aphis gossypii*); arañuela parda (*Bryobia rubrioculus*); arañuela roja europea (*Panonychus ulmi*); arañuela roja (*Tetranychus urticae*); pulgón lanígero del manzano (*Eriosoma lanigerum*); pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae*); Trips en palta (*Frankliniella schultzei*; *F. gemina*; *F. australis*; *Neohydatotrips spp*; *Heliothrips haemorrhoidalis*)

| Cultivo | Dosis y momento de aplicación |
|--|--|
| Cítricos | 0.8 a 1% durante todo el año |
| Manzano, Peral, Duraznero, Pelón, Ciruelo, Cerezo, Almendro, Damasco | 1.5% en otoño-invierno. 0.8 a 1% en primavera-verano |
| Olivo | 1.5% en otoño-invierno. 0.8 a 1% en primavera-verano. |
| Árboles y arbustos ornamentales | 0,8 a 1% en primavera-verano 1.5% en otoño-invierno |
| Palta | 2% en floración y en madurez de cosecha |

Época de aplicación: La aplicación debe coincidir con el nacimiento de las primeras ninfas, repitiendo cuando aparezca una nueva generación. No aplicar en floración.

De encontrarse con varias capas de cochinillas, será necesario cepillar el tronco previo a la aplicación del aceite.

RESTRICCIONES DE USO

Exento de Período de Carencia.

No aplicar con temperaturas superiores a 30 °C ni por debajo de 5 °C. No pulverizar en condiciones de sequía, con riesgo de heladas, durante la floración, plantas muy debilitadas por ataque de plagas, mojadas por la lluvia o con deficiente estado nutricional.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas de uso común, emulsionables y soluciones. Es incompatible con caldo bordelés, polisulfuro de calcio, captan, azufre y sus derivados.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones indicadas.


CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

En Huertas  y Jardines

Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

 +54 9 11 2389-3821

 (011) 4621-7723

 @mamboretta.ar

 /mamboretta.ar

 www.mamboretta.com.ar

 info@mamboretta.com.ar



CUIDADO

