

HERBICIDA

GRUPO 9



# Mamboretá

CONCENTRADO

SISTÉMICO  
SOLUBLE

# G

LINEA  
JARDIN

Composición:

glifosato: sal isopropilamina del N-fosfonometil glicina (*).....	48 g
inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100 cm <sup>3</sup>

(\*) Equivalente ácido glifosato 35,6 g/ml

**LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO  
ADJUNTO ÁNTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  
NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA**

Inscrito en la S.A.G.P. y A. - SENASA - con el N O 00463

INDUSTRIA ARGENTINA

No Inflamable

Fecha de Vencimiento:

Partida N O : Ver en el envase

Ver en el envase

Cont. Neto: Ver en el envase

**ARIPA S.R.L**

Cerrito 1133 (BI 714ARC) -Ituzaingó - Pcia. de Buenos Aires - Argentina

### PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación de los alimentos. Usar anteojos de protección, guantes, pantalones largos, remera con mangas largas durante la aplicación.

Evitar el contacto con la piel los ojos o la ropa de trabajo. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después de la aplicación.

Luego de usar, lavar bien la pulverizadora inmediatamente después de su uso y antes de emplearlas con insecticidas o fungicidas.

**RIESGOS AMBIENTALES:** LIGERAMENTE TOXICO para ABEJAS. LIGERAMENTE TOXICO para PECES. PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para AVES.

**DERRAMES:** En caso de derrames del producto, cubrir con material absorbente (tierra, aserrín, etc.). Barrer y enterrar en un lugar que no contamine fuentes de agua. Lave el área contaminada con abundante agua.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar en los envases originales, bien cerrados, en lugares secos, frescos y alejados de los alimentos.

**METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES:** ESTE ENVASE VACÍO NUNCA DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACIÓN. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, administrar papilla de carbón activado con agua cada 20 minutos. Por salpicaduras en piel lavar con abundante agua y jabón (no detergente). Por salpicaduras en ojos enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. LLAMAR AL MÉDICO.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:** LIGERAMENTE TOXICO CLASE III. Aplicar tratamiento sintomático.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Ciudad de Bs. As.: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004 - Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - Rosario: Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - Mendoza: Hospital Regional: Tel. (0261) 4200600 / 2653 / 0714 / 4800 - Neuquén: Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - Chaco: Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

**GENERALIDADES:** Mamboretá Sistémico G es un herbicida no selectivo para el control postemergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Por ser de acción sistémica es absorbido por hojas y tallos tiernos de las malezas, distribuyéndose hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte de las malezas emergidas. Los efectos SON LENTOS, especialmente en las malezas perennes, donde



CUIDADO

después de transcurridos 4 o 5 días de su aplicación, comienza el amarillamiento y marchitamiento en hojas y tallos, que progresivamente ocasiona la muerte de las malezas. Al no dejar residuos en el suelo, ya que es rápidamente inactivado por contacto con el mismo, se puede realizar cualquier tipo de siembra o plantación una vez que Mamboretá Sistémico G ha actuado sobre las malezas a controlar. Su baja volatilidad disminuye el peligro de su acción sobre sembrados y plantaciones vecinas al tratamiento.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Mamboretá Sistémico G tiene su mejor resultado cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento es por ello que los tratamientos deben efectuarse en primavera, principio del verano ó al comienzo del otoño.

Antes de roturar el terreno para la implantación de canteros ó siembra de céspedes, aplicar Mamboretá Sistémico G sobre las malezas. No pulverizar con amenazas de lluvia. Su acción es irreversible si transcurren 6 horas desde su aplicación sin que se produzca lavado por riego ó lluvia.

Mamboretá Sistémico G no tiene efecto residual sobre malezas provenientes de semillas en el suelo, para su eliminación se recomienda un tratamiento posterior cuando las malezas estén en activo crecimiento en la nueva temporada.

Dosificación: Este envase va acompañado de una medida graduada para dosificar con capacidad de 10 cm<sup>3</sup>

#### **EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:**

Con pulverizador manual, mochila o regadera de "flor fina": Evitar que la solución alcance las hojas, frutos y tallos verdes de las plantas deseables que se encuentren en las cercanías del predio o sector a tratar. En casos de no poder evitar el contacto del herbicida con las plantas deseables, utilizar barreras protectoras (película de polietileno, vallas uniformes de chapa o madera, etc.) por el termino de 3 a 7 horas desde la aplicación.

Con hisopo: Para el tratamiento puntual de malezas entrelazadas con plantas útiles, tome una varilla de madera (similar a las varillas para revolver pinturas) y ate en uno de sus extremos un trozo de espuma de goma o trapo absorbente. Moje ese extremo con la solución de Mamboretá Sistémico G y, sin que el hisopo choree ó gotee, aplique sobre las hojas de las malezas a eliminar.

#### **INSTRUCCIONES PARA EL USO:**

Por ser amplia la lista de especies controladas por Mamboretá Sistémico G, se citan solo las principales:

**ANUALES:** Las malezas anuales son más susceptibles al producto cuando tienen menos de 15 cm. de altura.

**GRAMINEAS:** Dosis de 20 a 30 cm<sup>3</sup> por litro de agua cada 100 m<sup>2</sup>

Capín - Pasto Cañada (Echinochloa colonum), Cola de zorra (Setaria spp.), Capín (Echinochloa crus-galli), Pasto Colchón ó pasto cuaresma (Digitaria spp.), Cebadilla criolla ó cebadilla australiana (Bromus unioloides).

**LATIFOLIADAS:** Dosis de 30 a 40 cm<sup>3</sup> por litro de agua cada 100 m<sup>2</sup>

Yuyo colorado - Ataco (Amaranthus spp.), Quinoa - Ceniza ó Yuyo blanco (Chenopodium spp.), Chamico (Datura ferox), Enredadera anual (Polygonum convolvulus), Sanguinaria - Cien nudos (Polygonum aviculare), Amor seco Saetilla (Bidens pilosa).

**PERENNES:** Las malezas perennes deben tratarse cuando estén entre el inicio de floración - plena floración y tengan abundante follaje para una mayor absorción y distribución.

Sorgo de alepo - Cañota ó pasto ruso (Sorghum halepense). Dosis: 40 cm<sup>3</sup> por litro de agua cada 100 m<sup>2</sup>. Gramón - Gramillón ó chepica (Cynodon dactylon), Cipero ó junquillo (Cyperus esculentus), Cipero - Cebollín - Juncea (Cyperus rotundus), Camalote ó Pasto de guinea (Panicum máximum), Sunchillo - Yuyo sapo ó Clavel amarillo (Wedelia glauca). Dosis: 60 cm<sup>3</sup> por litro de agua cada 100 m<sup>2</sup>.

**RESTRICCIONES DE USO:** Exento de período de carencia para plantas ornamentales, florales y céspedes.

#### **COMPATIBILIDAD:**

No aplicar con otros productos.

**AVISO DE CONSULTA TECNICA:** consulte su aplicación con un Ingeniero Agronomo.

#### **IMPORTANTE:**


Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescrito en este folleto.

En Huertas  y Jardines

# Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

 +54 9 11 2389-3821

 (011) 4621-7723

 @mamboreta.ar

 /mamboreta.ar

 www.mamboreta.com.ar

 info@mamboreta.com.ar



**CUIDADO**