



# Mamboretá

S U S P E N S I Ó N

C O N C E N T R A D A

LINEA  
JARDIN**Composición**

Carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-benzimidazol .....	50,00 g
humectante, dispersante e inerte c.s.p. ....	100 cm <sup>3</sup>

**LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO  
ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO  
NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA**

Inscrito ante el SENASA con el N° LJ 00524

ORIGEN: CHINA

PRODUCTO NO INFLAMABLE

N° DE LOTE: *Ver en el envase.*CONTENIDO NETO: *Ver en el envase.*FECHA DE VENCIMIENTO: *Ver en el envase.***ARIPA S.R.L.**

Cerrito 1133 (B1714ARC) - Ituzaingó - Provincia de Buenos Aires - Argentina  
 (011) 4621-7723 +54 11 2389-3821 www.mamboreta.com.ar

Este producto se elabora según normas de estricta calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haber observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en condiciones normales de almacenamiento.

**PRECAUCIONES**

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES**

Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación careta, antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

**RIESGOS AMBIENTALES****Aves**, Producto Prácticamente No Tóxico.**Peces**, Producto Prácticamente No Tóxico.**Abejas**, Producto Virtualmente no tóxico.**TRATAMIENTO Y MÉTODOS DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS**

Está prohibido por ley volver a utilizar, enterrar o quemar los envases. Entregar los envases por fuera de un sistema aprobado es infracción a la normativa ambiental. Para bidones y botellas de plástico respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado (TL) o Lavado a Presión (LP) siguiendo la Norma IRAM 12.069: TL - Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. LP - Se acciona el dispositivo 30 segundos. Considerar en el volumen de la mezcla al igual que para TL. Finalmente, para ambos procedimientos inutilizar el envase perforándolo en la base, intentando no dañar la etiqueta. Los envases deben entregarse en Centros de Almacenamiento Transitorio de la A.C. CampoLimpio SGE habilitados para su derivación a reciclado o disposición final, según la Ley Nacional N° 27.279 y reglamentación de autoridades competentes locales.

**ALMACENAMIENTO**

- No almacenar en casa habitada.
- Mantenga este producto lejos del calor y las llamas.
- Guardarlo bajo llave, en su envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Evite su derramamiento. Conservar el envase cerrado en lugar sombreado, fresco y seco.

**DERRAMES**

Absorber con tierra, arena húmeda u otro material inerte, recogerlo en bolsas e identificarlas para su posterior incinerado. Evitar la contaminación de aguas para uso doméstico y para riego.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Acudir al médico inmediatamente. En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:**

Clase III Producto Ligeramente peligroso. CUIDADO.

No irritante dermal. No sensibilizante dermal.

Toxicidad inhalatoria: Categoría II NOCIVO.

Moderado irritante ocular: Categoría III. CUIDADO. Causa irritación moderado a los ojos.

Grupo químico: Benzimidazol. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento asintomático.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA**

Irritante ocular y de las membranas mucosas.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES**

No posee. No se han informado casos de intoxicación en humanos.

**CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES**

0800-333-0160/ (011) 4658-7777/ (011) 4654-6648 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES. Policlínico Prof. A. Posadas -HAEDO (Prov. de Buenos Aires).

(011) 4962-6666/ (011) 4962-2247 UNIDAD TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS Dr. Ricardo Gutiérrez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

(011) 5950-8804/6 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA-UBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA**

No se conocen situaciones de potenciación, sinergismo y aditividad con otros productos.

**GENERALIDADES DEL PRODUCTO:**

Fungicida polivalente y sistémico con acción protectora y curativa. Es absorbido a través de las raíces y tejidos verdes, con translocación acrópeta. Actúa inhibiendo el desarrollo de tubos germinales, la formación del apresorio y el crecimiento del micelio. Persistencia de acción de 2 a 3 semanas.



CUIDADO



**INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN:** Llenar el tanque de la pulverizadora con las  $\frac{3}{4}$  partes de agua limpia. Con los agitadores en movimiento, agregar la cantidad de MAMBORETA H necesaria, de acuerdo con la dosis que corresponda y completar con agua hasta el volumen total. Las soluciones preparadas deben usarse en el día, no dejar para usar al día siguiente.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** MAMBORETA H puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/ cm<sup>3</sup> de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/ hora y evitar la aplicación sobre ríos, arroyos y lagunas.

**LAVADO DE EQUIPOS:** Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgos de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Apio	Viruela del apio ( <i>Cercospora apii</i> )	0,5 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Iniciar tratamientos con primeros síntomas a intervalos de 10 a 15 días.
Citrus	Mancha grasienta de los citrus ( <i>Mycosphaerella citri</i> )	0,75 – 1 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Aplicar durante marzo-mayo.
	Melanosis ( <i>Phomopsis citri</i> )		Comenzar los tratamientos a principio de marzo, repetir en caso de abundantes lluvias.
	Sarna del naranjo agrio ( <i>Sphacelona fawcettii</i> var. <i>Scabiosa</i> )	1 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	1ra. Aplicación al aparecer los pimpollos (agosto-septiembre) 2da. Aplicación desde la floración a la caída de las $\frac{3}{4}$ partes de los pétalos.
Cucurbitáceas Melón Pepino Zapallo Zapallito de tronco	Antracnosis de las cucurbitáceas ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> ) Podredumbre gris ( <i>Botrytis cinérea</i> )	0,25 – 0,5 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Tratamiento preventivo con intervalos de 20-28 días, cuando las plantas comienzan a extenderse o a la aparición de los primeros síntomas, cada 10-14 días.
	Mal de los almácigos ( <i>Sclerotinia spp.</i> ), Marchitamiento de las hortalizas, ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Oidio de las cucurbitáceas ( <i>Erysiphe fulginea</i> )	0,5 cm <sup>3</sup> / 0,5 L. de agua / Planta	Invernáculo: tratamiento preventivo. Regar con el caldo sobre el cuello de la raíz y repetir cada 4 semanas.
	Mal de los almácigos ( <i>Fusarium oxysporum</i> )		Regar con el caldo sobre el cuello de la raíz y repetir cada 4 semanas.
Duraznero	Podredumbre morena de los frutales ( <i>Monilia cinérea</i> )	0,5 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Una aplicación después de formado el fruto, repitiéndose el tratamiento cada 10 a 20 días, según condiciones climáticas.
	Sarna de los frutales de carozo ( <i>Cladosporium carpophilum</i> )	0,6 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Una aplicación después de formado el fruto, repitiéndose el tratamiento cada 10-20 días, según condiciones climáticas.
Frutilla	Podredumbre gris ( <i>Botrytis cinérea</i> )	0,5 – 0,7 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Realizar 3 tratamientos: 1) 50% de flores abiertas, 2) A la caída de los pétalos, 3) Cuando las frutillas empiezan a madurar.
Lechuga	Marchitamiento de las hortalizas ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Podredumbre gris ( <i>Botrytis cinérea</i> )		Iniciar los tratamientos después del enraizamiento, a intervalos de 10 a 15 días.
Manzano Peral Citrus	Moho o podredumbre de la fruta almacenada ( <i>Botrytis spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i> , <i>Phomopsis spp.</i> , <i>Diplodia spp.</i> , <i>Gloesporium spp.</i> , <i>Manilia spp.</i> )	0,5 - 1 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Realizar 2 aplicaciones: a los 20 y a los 7 días antes de la cosecha. Especialmente indicado para enfermedades del pedúnculo en algunas variedades de peras de invierno (por ej. D'Anjou).
	Sarna del manzano ( <i>Venturia inaequalis</i> )	0,5 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	1era: Antes de abrirse las yemas. 2da: Antes de la floración. 3er: Cuando han caído la mayor parte de los pétalos. 4ta: 10 días después.
Tomate	Mal de los almácigos ( <i>Rhizoctonia spp.</i> ), Marchitamiento ( <i>Verticillium dahliae</i> ), Podredumbres ( <i>Botrytis spp.</i> )	0,5 – 1 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Regar con 600 ml de solución por planta a los primeros síntomas y repetir a intervalos de 10-14 días.
	Marchitamiento de las hortalizas ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	0,5 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Primera aplicación: a los 30 días de la siembra. Otras aplicaciones: 2 adicionales con intervalos de 12 a 15 días.
	Podredumbre ( <i>Sclerotinia spp.</i> )	0,2 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Inmediatamente después del trasplante.
Vid	Podredumbre gris ( <i>Botrytis cinérea</i> )	0,5 – 1 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Según la variedad de vid y el desarrollo de las condiciones climáticas realizar de 3 a 5 tratamientos a intervalos de 10 a 14 días.

Uso: Fungicida (postcosecha)

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Fresias Gladiolo Tulipán	Hongos del suelo ( <i>Penicillium spp.</i> ), Hongos del suelo ( <i>Fusarium spp.</i> ), Mal de los almácigos ( <i>Rhizoctonia spp.</i> ), podredumbres ( <i>Botrytis spp.</i> )	2 cm <sup>3</sup> / 1 L. de agua	Sumergir los bulbos durante 10-15 minutos, poco antes de la siembra.

#### RESTRICCIONES DE USO:

Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir:

Pepino, Zapallo, Zapallito de tronco, Frutilla: **3 días.**

Melón, Lechuga, Apio, Alcaucil, Repollo, Repollito de bruselas, Poroto, Arveja, Tomate, Berenjena, Pimiento, Pera, Manzano, Durazno, Frutos cítricos, Banana, Ananá, Maní (Grano), Soja (Grano), Aceituna: **7 días.**

Palto, Ajo, Cebolla, Lúpulo, Uva: **14 días**

Remolacha, Frambuesa, Grosella, Zorzamora: **15 días.**

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

#### COMPATIBILIDAD

Puede ser usado en combinación con la difenilamina como también ser mezclado con los fungicidas comunes que existen en el mercado. Los insecticidas y acaricidas deben ser agregados al caldo fungicida poco tiempo antes de la pulverización. Es incompatible con los productos de fuerte reacción alcalina (caldo bordelés. Polisulfuro de calcio). Para lograr una mejor distribución del producto agregar coadyuvante no iónico a razón de 25 cm<sup>3</sup>/hl de caldo de pulverización.

#### FITOTOXICIDAD:

No fitotóxico cuando se usa según indicaciones del marbete.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

En Huertas  y Jardines

# Mamboretá

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

+54 9 11 2389-3821

(011) 4621-7723

@mamboreta.ar

/mamboreta.ar

www.mamboreta.com.ar

info@mamboreta.com.ar



CUIDADO

